

Επιδημιολογική μελέτη καταγραφής ασθενών με HIV/HCV συλλοίμωξη στη ΜΕΛ ΑΤΤΙΚΟΝ

Κ. Πρωτοπαπάς, Α. Χούντα, Γ. Σιακαλής, Π. Φράγκου, Δ. Καββαθά, Χ. Οικονομοπούλου, Α. Παπαδόπουλος, Α. Αντωνιάδου

Εισαγωγή: Η αύξηση των HIV μολύνσεων μετά το 2011 στα άτομα με ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών (ΧΕΝ) και η αύξηση των περιπτώσεων ΗCV λοίμωξης (συχνά οξείας) σε HIV+ άντρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άντρες (ΑΣΑ), οδήγησαν στην αλλαγή της επιδημιολογίας της HIV/HCV συλλοίμωξης στα άτομα που παρακολουθούνται στις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων.

Σκοπός: Η μελέτη των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των ασθενών με συλλοίμωξη HIV/HCV σε ΜΕΛ ελληνικού νοσοκομείου και της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας σε σχέση με τη διάγνωση και θεραπεία.

Υλικό/Μέθοδος: Συγχρονική μελέτη καταγραφής (μη παρεμβατική) των ασθενών με HIV/HCV συλλοίμωξη που διαγνώσθηκαν στη ΜΕΛ του Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ (δημογραφικά δεδομένα, εργαστηριακές παράμετροι, βαθμός ηπατικής ίνωσης, ιστορικό αντιρετροϊκής αγωγής και αντι-HCV θεραπείας).


Επιδημιολογική μελέτη καταγραφής ασθενών με HIV/HCV συλλοίμωξη στη ΜΕΛ ΑΤΤΙΚΟΝ

Κ. Πρωτοπαπάς, Α. Χούντα, Γ. Σιακαλής, Π. Φράγκου, Δ. Καββαθά, Χ. Οικονομοπούλου, Α. Παπαδόπουλος, Α. Αντωνιάδου

Συνολικά **128 άτομα** (11,4% των ασθενών της ΜΕΛ) καταγράφονται με συλλοίμωξη HIV/HCV [81,2% άρρενες, μέση ηλικία 36,5 (22-74)].

Οι 9/17 ΑΣΑ είχαν οξεία HCV λοίμωξη

HIV/HCV συλλοίμωξη



Από τα 128 καταγεγραμμένα με συλλοίμωξη άτομα:

14 (10,9%) απεβίωσαν (όλοι ΧΕΝ που απεβίωσαν από επιπλοκές της χρήσης ουσιών)


34 (26,5%) χάθηκαν από την παρακολούθηση (όλοι ΧΕΝ)

6 άτομα συνέχισαν την παρακολούθηση τους σε άλλη ΜΕΛ

74/128 άτομα συνεχίζουν την παρακολούθηση τους στη ΜΕΛ ΑΤΤΙΚΟΝ



Επιδημιολογική μελέτη καταγραφής ασθενών με HIV/HCV συλλοίμωξη στη ΜΕΛ ΑΤΤΙΚΟΝ

Κ. Πρωτοπαπάς, Α. Χούντα, Γ. Σιακαλής, Π.Φράγκου, Δ. Καββαθά, Χ. Οικονομοπούλου, Α. Παπαδόπουλος, Α. Αντωνιάδου



Από τα 74 άτομα που συνεχίζουν την παρακολούθησή τους στη ΜΕΛ ΑΤΤΙΚΟΝ όλοι βρίσκονται υπό αντιρετροϊκή αγωγή και το 88% έχει μη ανιχνεύσιμο ιϊκό φορτίο

Γονότυπος



Μόνο στο 45% υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα για γονότυπο και HCV RNA ενώ αποτελέσματα ελαστογραφίας υπάρχουν στο 19,7%. Όσον αφορά τη θεραπεία της HCV λοίμωξης, το 12,6% εμφάνισε αυτόματη κάθαρση του ιού και από τους υπόλοιπους το 22,5% έλαβε αγωγή με PegIFN και ριμπαβιρίνη εκ των οποίων το 58% εμφάνισε SVR ενώ μόλις 1 ασθενής έλαβε τα νεότερα DAAs.

Συμπέρασμα: Η πλειοψηφία των ασθενών με συλλοίμωξη HIV/HCV στη ΜΕΛ ΑΤΤΙΚΟΝ είναι ΧΕΝ. Η παρακολούθηση και θεραπεία της HCV λοίμωξης στην εποχή που η ίαση είναι δυνατή σε ποσοστό >95%, υπολείπεται σημαντικά, γεγονός που πρέπει να διορθωθεί άμεσα με την διευκόλυνση στην πρόσβαση στην αποτελεσματική θεραπεία.