

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΕΓΚΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ-Α (PEG-IFN-Α)  
ΚΑΙ ΡΙΜΠΑΒΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΝΔΥ  
ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C (ΧΗC)



*Καπάταης Ανδρέας (1), \**  
*Καραουλάνη Θεοφανή\* (2),*  
Ουρανού Ευαγγελία(3),  
Λαμπρόπουλος Παναγιώτης(3),  
Κίτνα Αικατερίνη(4),  
Παύλου Μαίρη(5),  
Καραμανλή Κωνσταντίνα(6),  
Υφαντή Αρετή(6),  
Παπαναστασίου Ανδρέας(7)



- (1) Διευθυντής, Α' Παθολογική κλινική, ΓΝΝΠ "Άγιος Παντελεήμων"- ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβάρα"- Α' Ηπατολογικό Ιατρείο  
(2) Ειδικευμένη Βιοπαθολογίας Παθολογικό - Ηπατολογικό τμήμα ΓΝΝΠ-"Άγιος Παντελεήμων" - ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβάρα"  
(3) Ειδικευμένοι παθολογίας, Συνεργάτες Α' Ηπατολογικό Ιατρείου - ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβάρα"  
(4) Ειδικευόμενη παθολογίας, ΓΝΝΠ "Άγιος Παντελεήμων" - ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβάρα"  
(5) Προϊσταμένη MSc Παθολογική-Ηπατολογική κλινική, ΓΝΝΠ "Άγιος Παντελεήμων"- ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβάρα"  
(6) Νοσηλεύτρια, Παθολογικό - Ηπατολογικό τμήμα ΓΝΝΠ "Άγιος Παντελεήμων" - ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβάρα"  
(7) Διευθυντής, Βιοπαθολόγος, ΓΝΝΠ "Άγιος Παντελεήμων" - ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβάρα"

## Εισαγωγή-σκοπός:

Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση του ποσοστού παρατεινόμενης ιολογικής ανταπόκρισης(SVR) σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς ΧΗC με ΧΗC που έλαβαν συνδυαστική αγωγή με PEG-IFN-A και RIBAVIRIN.

## Υλικό-μέθοδος:

Μελετήθηκαν 118 ασθενείς με ΧΗC και αντιρροπούμενη ηπατική νόσο που ολοκλήρωσαν τη συνδυαστική αγωγή

24 ή 48 εβδομάδων (ανάλογα με το γονότυπο) με PEG-IFN-A και RIBAVIRIN μεταξύ των ετών 2009-2013 πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της θεραπείας.

## Αποτελέσματα:

Συνολικά 95/118(80,5%) ασθενείς παρουσίασαν SVR(59/67) 88,1% ΧΗC σε αντίθεση με μη-ΧΗC (36/51) 70,6% ( $p=0,032$ ) σε αντίθεση με μη-ΧΗC. 62,7% (47/75) παρουσίασαν RVR και 44(93,6%) από αυτούς είχαν και SVR. Στην μελέτη μας, η ηλικία, ο

τρόπος μετάδοσης και η παρουσία RVR( $p=0,003$ ) συσχετίζονται θετικά με την SVR ενώ βρέθηκε οριακά η συσχέτιση με τα προ θεραπείας επίπεδα HCV-RNA(<700000 ή 7000000IU/ml-  $p=0,056$ ).

Στην μελέτη μας, μόνο η παρουσία RVR ( $p=0,008$ ) συσχετιζόνταν θετικά με την SVR συνεκτιμώντας την ηλικία ( $p=0,523$ ),

το φύλο ( $p=0,357$ ), το BMI ( $p=0,954$ ) και τον τρόπο μετάδοσης της λοίμωξης ( $p=0,683$ ).

## Συμπεράσματα:

Η ολοκλήρωση της συνδυαστικής κλασικής αγωγής με PEG-IFN-A και RIBAVIRIN δίνει υψηλά ποσοστά τόσο

SVR όσο και RVR στο σύνολο των πρωτοθεραπευόμενων ασθενών με ΧΗC στους χρήστες IVDU.

Ηπατίτιδα C (HCV)  
Εγώ γνωρίζω και προσέχω! Εσύ;



HCV

